


1. **Stand der Trockenschäden in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 10. Juni 2008)**

M. Berlik, LMS

	NWM, DBR, NVP, RÜ	GÜ, Demmin, OVP	Ludw., Parchim, MÜ, MST, Uecker-Randow
Wintergerste	Ertragsverluste zeichnet auf allen Standorten	Ertragsverluste zeichnet auf allen Standorten	Starke Ertragsausfälle (MÜ) leere Ähren z.T. Totalausfall
Winterweizen	Trockennester noch ausreichend grüne Blattmasse	große Trockennester, jeden Tag mehr	große Trockennester, jeden Tag mehr
Winterroggen		auf leichtem Standort große Verluste	leichte Standorte - weiss, keine Ertragserwartung (MÜ)
Sommergetreide	kaum Bestand, kniehoch seit Auflauf kein Regen	kaum Bestand, kniehoch	stark geschädigt, jetzt auch noch Läuse im Hafer
Winterraps	gute Bestände auf guten Standorten	wird braun und welk auf leichten Böden	wird braun und welk auf leichten Böden (MST braun - starke Verluste)
Mais	starke Schwankungen im Bestand Auflaufprobleme, sonst i.O.	starke Schwankungen im Bestand Auflaufprobleme, sonst i.O.	beginnt zu drehen
Zuckerrüben	lückige Bestände	lückige Bestände	lückige Bestände
Gras (mineral.)	2. Schnitt - kein Aufwuchs	kein Aufwuchs	kein Aufwuchs
LMS Marktfruchtberater; Ellerkamp; Kohn; Fischer, Dreyer; Ullrich - Erfahrungsberichte			

Küstenregion



**Mittleres und
östliches
Mecklenburg-
Vorpommern**

**Südliches
Mecklenburg-
Vorpommern**